

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-6-68 798802

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 140532 F.

25 Frs

Supplément n° 4 au Bulletin n° 92 - MAI 1968

29 MAI 1968

V I G N E

MILDIU : Cette maladie est apparue le 26 Mai sporadiquement sur feuilles de base. Les conditions atmosphériques actuelles sont très favorables à son extension. Il est urgent et indispensable d'assurer la protection des grappes dès réception de l'avis. Forcer les doses de produits. Poursuivre l'ébourgeonnage, puis procéder au relevage des sarments. Les vignes ayant été gelées ou partiellement gelées devront faire l'objet de soins particuliers.

VERS DE LA GRAPPE : Ajouter à la bouillie précédente un produit du type curatif.

OIDIUM : Ajouter un soufre mouillable ou un produit à base de Dinocap.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DES POMMIERS & POIRIERS : Renouveler le traitement.

CARPOCAPSE : Plein vol des papillons. Ajouter un insecticide à la bouillie.

ANTHRACNOSE DU CERISIER : Appliquer un traitement contre cette maladie. Utiliser la Daguidine à 90 gr de Matière Active à l'Hectolitre.

MOUCHE DE LA CERISE : Le vol se poursuit il est urgent d'assurer la protection avec l'un des produits conseillés (Voir liste) en respectant strictement les délais d'emploi avant récolte.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIU DE L'OIGNON : Les récentes pluies orageuses étant favorables au développement de cette maladie nous conseillons de réaliser un traitement dans tous les secteurs sensibles, en particulier sur semis. Utiliser un produit organique de synthèse en atomisation de préférence.

BOTRYTIS FRAISE : Sur variétés tardives non encore en cours de récolte, effectuer un traitement les risques de développement de la maladie étant importants actuellement. Utiliser : Captane - Phaltane : 2 kg M.A./Ha, Thirame : 3 kg, 2 ou Dichlofluanide : 1 kg.

Les Ingénieurs-Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur de
la Protection des Végétaux - Circonscription
Phytosanitaire " BOURGOGNE & FRANCHE COMTE "
H. SOULIE

Imprimerie de la Station de Bourgogne et Franche-Comté
Le Directeur-Gérant
L. BOUYX

P 231